

fastquel calcio

CALCIO COMPLEJADO CON AMINOÁCIDOS

Corrector de carencias de calcio en forma complejada para poder ser aplicado tanto por VÍA FOLIAR COMO RADICULAR. Formulado en base a un hidrolizado enzimático de **origen vegetal** y enriquecido con complejo vitamínico, ácido láctico estimulando la síntesis proteica. Desarrollado para la prevención y/o corrección de carencias y/o desequilibrios en la asimilación de éste.

Los **AMINOÁCIDOS DE FASTQUEL CALCIO** son biológicamente activos, favoreciendo la absorción y traslocación del Calcio hacia los órganos de crecimiento de la planta. Es un calcio rápidamente asimilable. Su formulación complejada permite una rápida respuesta por parte de la planta (foliar-radicular).

FASTQUEL CALCIO es un formulado de calcio altamente eficaz con un impacto positivo directo sobre los cultivos en los momentos del ciclo vegetativo más críticos o de mayor exigencia por parte de la planta.



1 l. 5 l. 20 l.

Riquezas garantizadas			
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	14,00 % p/p	20,86 % p/v	
Aminoácidos libres	3,00 % p/p	4,47 % p/v	
Nitrógeno (N) total	10,00 % p/p	14,90 % p/v	
Nitrógeno (N) nítrico	8,10 % p/p	12,07% p/v	
Nitrógeno (N) amoniacal	1,00 % p/p	1,49 % p/v	
Nitrógeno (N) orgánico	0,60 % p/p	0,89 % p/p	
pH (directo)	4,26	Densidad	1,49 g/cc

Aminograma: Asp, Glu (1,8%), Ser, Gly, Thr, Arg, Ala, Val, Ile, Leu, Lys, Pro.

Dosis, cultivos y método de aplicación		
Cultivos	Uso Foliar	Uso Radicular
En general	200-300 cc/hl cada 15-20 días según necesidad	10-20 l/ha en 2-5 pases según necesidad
Cultivos	Control de aplicación	
Tomate - Pimiento - Berenjena	Podredumbre apical "peseta"	
Melón	Engorde de frutos a la salida de cuaje / prevención vitescencia	
Calabacín, pepino, judía	Engorde y alargamiento del fruto	
Apio - carlota - chirivía	Corazón negro	
Lechuga	Puntas quemadas períodos crecimiento rápido	
Escarola - endivia	Corazón marrón	
Col	Puntas quemadas del interior	
Cultivos hortícolas en invernadero	·Tratamientos foliares: 200 cc / hl Tratamientos riego localizado: 5-7 lt/ha, repitiendo s/ necesidades con una periodicidad de 7-15 días	
Cítricos	Rajado del fruto, manchas de la piel, etc. (3 pases)	
Manzanas	Bitter Pitt (3 l/ha x 4pases)	
Viña	Calidad (1-1,5 l/ha)	
Advertencias e incompatibilidades		

No se debe mezclar con productos ricos en cobre, azufre o aceites minerales. Tampoco se debe mezclar con productos muy ácidos o muy alcalinos. En caso de duda se recomienda realizar una prueba previa.